

**Intégration et Probabilités**

Examen du 22 octobre 2010

durée 3h

*Les documents et calculatrices sont interdits.*

\*\*\*

On rappelle les résultats suivants, démontrés en Travaux Dirigés, que l'on pourra utiliser sans démonstration.

- Si  $(x_n)_{n \geq 1}$  et  $(y_n)_{n \geq 1}$  sont deux suites réelles, avec  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y$ , alors

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = y + \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

- Si  $(x_n)_{n \geq 1}$  et  $(y_n)_{n \geq 1}$  sont deux suites réelles, avec  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y > 0$ , alors

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (x_n y_n) = y \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

- Si  $(x_n)_{n \geq 1}$  est une suite réelle et  $N$  un entier naturel quelconque non nul, alors

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n = \max_{0 \leq r < N} \overline{\lim}_{p \rightarrow +\infty} x_{pN+r}.$$

\*\*\*

**Exercice 1**

1. Soit  $\Omega$  un ensemble fini. Montrer que la tribu  $\mathcal{P}(\Omega)$  est engendrée par les singletons  $\{x\}$ , où  $x$  décrit  $\Omega$ .
2. Soit  $n$  un entier naturel non nul. On pose  $\Omega = \{1, \dots, n\}$  et  $\Omega' = \{1, \dots, 2n\}$ . On note  $\mathcal{A}$  l'ensemble des parties  $A$  de  $\Omega'$  telles que

$$\forall x \in \{1, \dots, 2n\} \quad (x \in A) \iff (2n + 1 - x) \in A.$$

- (a) Montrer que  $\mathcal{A}$  est une tribu.
- (b) Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \psi : \Omega' &\rightarrow \Omega \\ x &\mapsto \min(x, 2n + 1 - x) \end{aligned}$$

est  $(\Omega', \mathcal{A}) - (\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$  mesurable.

## Exercice 2

Soient  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé ;  $(A_n)_{n \geq 1}$  une suite décroissante d'événements sur  $\Omega$  avec  $\mathbb{P}(A_1) = 1/2$ , et

$$\forall n \geq 1 \quad \mathbb{P}(A_{n+1}^c | A_n) \leq \frac{1}{(n+1)^2}.$$

1. Montrer que

$$\forall n \geq 1 \quad \mathbb{P}(A_n) \geq \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{(i+1)^2}\right) \geq \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{i(i+1)}\right).$$

2. Montrer que pour tout  $x \in [0, 1/2]$ ,  $-\log(1-x) \leq 2x$ . En déduire que

$$\forall n \geq 1 \quad \mathbb{P}(A_n) \geq \frac{1}{2e^2}.$$

3. Montrer que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right) > 0.$$

## Problème

Soit  $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+$  une fonction croissante telle que

$$S = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{h(k)}{k(k+1)} < +\infty.$$

On suppose que la fonction  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifie  $\phi(0) = 0$  et :

$$\forall x, y \in \mathbb{N}^2 \quad \phi(x+y) \leq \phi(x) + \phi(y) + h(x+y).$$

Le but de ce problème est de démontrer un théorème de Hammersley (1961) : la suite  $\phi(n)/n$  converge vers un certain  $L < +\infty$ .

1. Soit  $n$  un entier naturel non nul. Montrer que

$$\frac{h(n)}{n} \leq 2 \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{h(k)}{k(k+1)} \tag{1}$$

2. En déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{h(n)}{n} = 0$ .

3. Soient  $p, N, r$  des entiers naturels avec  $0 \leq r < N$ . Montrer que

$$\phi(pN+r) \leq \phi(pN) + \phi(r) + h((p+1)N).$$

En déduire que pour tout entier  $N$  non nul, on a

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{\phi(n)}{n} \leq \overline{\lim}_{p \rightarrow +\infty} \frac{\phi(pN)}{pN}.$$

4. Montrer que pour quels que soient les entiers naturels  $N$  et  $n$ , on a

$$\frac{\phi(2^n N)}{2^n} \leq \phi(N) + \sum_{i=1}^n \frac{h(2^i N)}{2^i}. \quad (2)$$

(On convient que la somme à droite est nulle pour  $n = 0$ .)

5. Soit  $N$  et  $p$  des entiers naturels non nuls quelconques. On suppose que l'entier naturel  $p$  s'écrit en base 2 :

$$p = \sum_{k=0}^{\ell} 2^k a_k, \text{ avec } a_k \in \{0; 1\}.$$

On a donc  $a_\ell = 1$ . On pose

$$s_{-1} = 0 \text{ et, pour } 0 \leq n \leq \ell : s_n = \sum_{k=0}^n 2^k a_k.$$

(a) Montrer que

$$\forall n \in \{0, \dots, \ell\} \quad \phi(s_n N) - \phi(s_{n-1} N) \leq a_n \phi(2^n N) + h(2^{n+1} N).$$

(On pourra distinguer les cas suivant la valeur de  $a_n$ .)

(b) On donne l'identité

$$\sum_{n=0}^{\ell} \left( \sum_{i=1}^n \frac{h(2^i N)}{2^i} 2^n + h(2^{n+1} N) \right) = 2^{\ell+1} \sum_{i=1}^{\ell+1} \frac{h(2^i N)}{2^i},$$

qu'on ne demande pas de vérifier. Montrer

$$\phi(pN) \leq p\phi(N) + \sum_{n=0}^{\ell} \left( \sum_{i=1}^n \frac{h(2^i N)}{2^i} 2^n + h(2^{n+1} N) \right) \leq p\phi(N) + 2p \sum_{i=1}^{\ell+1} \frac{h(2^i N)}{2^i}.$$

(On pourra utiliser l'inégalité (2).)

(c) En déduire

$$\phi(pN) \leq p\phi(N) + 4pN \sum_{k=2N}^{+\infty} \frac{h(k)}{k(k+1)}. \quad (3)$$

(On pourra utiliser l'inégalité (1).)

6. On pose  $L = \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{\phi(n)}{n}$ . Montrer que  $L < +\infty$ .

7. Soit  $L' > L$  et  $\varepsilon > 0$ .

(a) Montrer qu'il existe un entier naturel  $N$  tel que

$$\frac{\phi(N)}{N} \leq L' \text{ et } \sum_{k=2N}^{+\infty} \frac{h(k)}{k(k+1)} \leq \varepsilon.$$

(b) En déduire

$$\overline{\lim}_{p \rightarrow +\infty} \frac{\phi(pN)}{pN} \leq L' + 4\varepsilon.$$

8. Montrer que pour tout  $L' > L$ ,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{\phi(n)}{n} \leq L'.$$

Conclure.

**FIN**